

DEFECOGRAMA

Defecograma

Avalia o ato da DEFECAÇÃO (EVACUAÇÃO), após a injeção de contraste no reto.

Defecar

É o ato de purgar as fezes do organismo, através do relaxamento do esfíncter e contrações do reto anal.

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- ✓ Intussuscepção Retal do Reto

DEFECOGRAMA

INDICAÇÕES CLÍNICAS:

- Tempo retal
- posição da mucosa do canal anal
- ação esfinteriana
- incontinência fecal
- DISQUEZIA

Disquezia

A disquezia é a dificuldade para evacuar causada por uma incapacidade de controlar os músculos pélvicos e anais.



Para realizar uma evacuação adequada, é necessário o relaxamento dos músculos da pelve e dos músculos circulares (esfíncteres) que mantêm o ânus fechado.

Caso contrário, os esforços para evacuar serão inúteis, mesmo quando eles forem consideráveis. Os indivíduos com disquezia sentem a necessidade de evacuar, mas não conseguem fazê- lo.

Mesmo a eliminação de fezes moles pode ser difícil.

As condições que podem interferir no movimento muscular incluem a discinesia do assoalho pélvico (distúrbio da coordenação muscular), o anismo (uma condição na qual os músculos não relaxam ou contraem de forma paradoxal durante a evacuação), a retocele (herniação do reto no interior da vagina), a enterocele (herniação do intestino delgado no interior do reto), a úlcera retal e o prolapso retal.

A cirurgia pode ser necessária para a reparação de uma enterocele ou de uma retocele volumosa. A constipação pode tornar-se tão severa que as fezes devem ser removidas por um médico ou por um enfermeiro com o auxílio de uma sonda ou digital.



Anatomia


Preparo

- ✓ Dieta leve na noite anterior ao exame;
- ✓ Jejum incluindo líquidos;



O assento sanitário é utilizado no exame devendo ser radiotransparente, resistente e ter um desenho que permita a obtenção de projeções laterais e frontais. É utilizada uma base de madeira para que haja uma boa exposição do reto.





Chassis utilizados 35X35



Protocolo do exame


Chegar 2 horas antes do horário marcado para ingerir 2 copos de sulfato de bário.

- ✓ Radiografia frente e perfil da Pelve
- ✓ Radiografia repouso
- ✓ Radiografia contração
- ✓ Radiografia valsalva
- ✓ Radiografia evacuação
- ✓ Radiografia pós-evacuação em repouso





DEFECOGRAMA



Perfil

Repouso

Contração

Evacuação

Pós-Evacuação



Documentação do Exame

Utilizamos na documentação (Digital) 4 filmes 35x43 divididos transversalmente.

Os adventos tecnológicos têm tornado o Defecograma um exame menos comum no estudo do trato gastro intestinal inferior, todavia continua sendo realizado em alguns serviços, onde através da correta utilização de suas técnicas e procedimentos proporciona um resultado diagnóstico eficiente e satisfatório.



FIM